

「フィールド(現場)検定成績」(吾平藤)

| 性 別 | 母の父 | 母母の父 | 生年月日 | 導 入 年月日 | 開始 日 齢 | 開始 体 重 | 出荷先 | 出 荷 年月日 | 肥育 日 数 | 出荷 体 重 | 枝肉 重 量 | 着 歩 留 | ロー ス 芯 | バラ 厚 | 皮下 脂 肪 | 推定 歩 留 | BMS NO | BCS NO | 格 付 |
|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 去 | 宝政 | 菊照美 | H17.8.25 | H18.5.17 | 265 | 326 | 鹿屋食肉 | H20.2.12 | 636 | 843 | 510.7 | 60.6 | 56 | 8.2 | 3.3 | 72.8 | 8 | 4 | A-5 |
| 2 去 | 神高福 | 第20平茂 | H17.9.12 | H18.6.14 | 275 | 271 | 鹿屋食肉 | H20.2.5 | 601 | 673 | 467.5 | 69.5 | 52 | 8.6 | 4.7 | 71.9 | 8 | 4 | B-5 |
| 3 去 | 北国7の3 | 忠福 | H17.9.10 | H18.6.15 | 278 | 256 | 知覧食肉 | H20.2.4 | 599 | 666 | 427.2 | 64.1 | 48 | 7.8 | 2.3 | 73.5 | 5 | 4 | A-4 |
| 4 去 | 第15平茂 | 神高福 | H17.9.11 | H18.6.15 | 277 | 281 | 知覧食肉 | H20.2.4 | 599 | 630 | 387.5 | 61.5 | 55 | 7.6 | 3.8 | 73.4 | 5 | 3 | A-4 |
| 5 去 | 北国7の3 | 第20平茂 | H17.8.20 | H18.5.18 | 271 | 304 | 鹿屋食肉 | H20.2.6 | 629 | 776 | 466.5 | 60.1 | 44 | 8.2 | 3.2 | 71.9 | 5 | 4 | B-4 |
| 6 去 | 神高福 | 糸藤 | H17.3.24 | H17.12.1 | 252 | | 京都 | H19.12.6 | 735 | 750 | 481.9 | 64.3 | 59 | 8.0 | 2.8 | 73.9 | 4 | 4 | A-3 |
| 7 去 | 玉三郎 | 富金 | H17.9.2 | H18.6.8 | 279 | | スターゼン阿久根 | H20.4.7 | 669 | 749 | 464.1 | 62.0 | 58 | 6.7 | 2.0 | 73.8 | 4 | 4 | A-3 |
| 8 去 | 金水9 | 忠福 | H17.8.10 | H18.5.19 | 282 | 275 | 鹿屋食肉 | H20.1.20 | 611 | 673 | 423.8 | 63.0 | 44 | 6.9 | 3.7 | 71.1 | 4 | 3 | B-3 |
| 9 去 | 谷秋 | 宝春 | H17.9.14 | H18.6.14 | 273 | 267 | 鹿屋食肉 | H20.2.5 | 601 | 709 | 441.3 | 62.2 | 36 | 7.8 | 3.1 | 71.0 | 3 | 5 | B-3 |
| 10 去 | 神高福 | 金徳 | H17.5.24 | H18.2.25 | 277 | | ナンチク | H19.10.10 | 592 | 742 | 459.4 | 61.9 | 47 | 6.6 | 2.6 | 71.9 | 3 | 4 | A-2 |
| 11 去 | 平茂勝 | 神高福 | H17.8.23 | H18.5.18 | 268 | 247 | サンキョーミート | H19.12.6 | 567 | | 361.7 | | 49 | 6.7 | 3.5 | 72.6 | 2 | 5 | A-2 |
| 去 平均 | | | 11 | | 272 | 278 | | | 622 | 721.1 | 444.7 | 62.9 | 50 | 7.6 | 3.2 | 72.5 | 4.6 | | |
| 1 雌 | 金幸 | 平茂勝 | H17.6.15 | H18.4.1 | 290 | | 京都 | H20.1.28 | 667 | 692 | 438.7 | 63.4 | 57 | 8.2 | 1.3 | 75.6 | 10 | 4 | A-5 |
| 2 雌 | 糸福 | 金徳 | H17.7.31 | H18.6.1 | 305 | | ナンチク | H20.2.19 | 628 | 603 | 382.1 | 63.4 | 65 | 7.3 | 2.0 | 76.2 | 10 | 4 | A-5 |
| 3 雌 | 宝勝 | 第20平茂 | H17.10.31 | H18.8.1 | 274 | 230 | スターゼン | H20.3.31 | 608 | 623 | 382.1 | 61.3 | 48 | 8.4 | 3.9 | 73.0 | 9 | 4 | B-5 |
| 4 雌 | 忠菊 | 第7糸桜 | H17.4.4 | H18.1.7 | 278 | | ナンチク | H19.10.25 | 656 | 761 | 487.9 | 64.1 | 54 | 8.6 | 4.0 | 72.5 | 7 | 3 | A-4 |
| 5 雌 | 金幸 | 平茂勝 | H17.8.31 | H18.4.20 | 232 | 180 | 鹿屋食肉 | H20.1.21 | 641 | 570 | 351.1 | 61.6 | 51 | 8.5 | 3.1 | 74.6 | 7 | 4 | A-4 |
| 6 雌 | 第5隼福 | 神高福 | H17.8.1 | H18.6.29 | 332 | | ナンチク | H20.1.7 | 557 | 609 | 383.1 | 62.9 | 42 | 8.0 | 4.0 | 71.8 | 7 | 4 | B-4 |
| 7 雌 | 金幸 | 神高福 | H18.1.11 | H18.10.11 | 273 | | ナンチク | H20.6.8 | 606 | | 405.4 | | 54 | 7.8 | 5.2 | 71.9 | 7 | 3 | B-4 |
| 8 雌 | 金幸 | 糸治 | H17.8.21 | H18.4.1 | 223 | | 京都 | H20.6.27 | 818 | 763 | 517.0 | 67.8 | 56 | 9.7 | 4.2 | 72.9 | 6 | 5 | B-4 |
| 9 雌 | 神徳福 | 平茂勝 | H17.8.21 | H18.5.17 | 269 | 212 | 鹿屋食肉 | H19.12.4 | 566 | 573 | 368.1 | 64.2 | 58 | 6.8 | 3.5 | 73.8 | 5 | 4 | A-4 |
| 10 雌 | 金幸 | 紋次郎 | H17.9.9 | | | 212 | 加古川 | H20.1.14 | | 573 | 343.0 | 59.9 | 48 | 6.3 | 2.3 | 73.5 | 5 | 5 | A-4 |
| 11 雌 | 神高福 | 金徳 | H17.5.24 | H18.2.25 | 277 | | ナンチク | H19.10.10 | 592 | 742 | 454.9 | 61.3 | 47 | 6.6 | 2.6 | 71.9 | 3 | 4 | A-2 |
| 12 雌 | 神高福 | 第20平茂 | H17.8.21 | H18.5.18 | 270 | 222 | サンキョーミート | H20.1.20 | 612 | | 327.3 | | 48 | 6.3 | 3.3 | 72.8 | 3 | 5 | A-2 |
| 13 雌 | 第20平茂 | 隼信 | H17.8.20 | H18.6.16 | 300 | 243 | 鹿屋食肉 | H19.12.20 | 552 | 571 | 349.6 | 61.2 | 45 | 6.2 | 3.7 | 71.7 | 2 | 5 | B-2 |
| 雌 平均 | | | 13 | | 277 | 217 | | | 625 | 643.6 | 399.3 | 62.8 | 52 | 7.6 | 3.3 | 73.2 | 6.2 | | |
| 全体の平均 | | | 24 | | 275 | 252 | | | 624 | 680.5 | 420.1 | 62.9 | 51 | 7.6 | 3.3 | 72.9 | 5.5 | | |
| 「金幸」母系の平均(雌5頭) | | | | | 255 | 196 | | | 683 | 649.5 | 411.0 | 63.2 | 53 | 8.1 | 3.2 | 73.7 | 7.0 | | |

「吾平藤」号のフィールド検定は、母系が15頭と多かった影響もあり、枝肉重量にバラツキが見受けられたものの、それ以外の各項目で県平均を上回る成績となりました。
BMSNoは去勢・雌の平均が5.5(県平均4.9)、特に「金幸」母系(雌5頭)では7.0(同4.5)、枝肉重量においても411kg(同405.8)であり、栄光系(金幸など)との交配が推奨されます。

| | 去勢 | 雌 | 全体 |
|----|-----|-----|-----|
| 5率 | 18% | 23% | 21% |
| 4率 | 27% | 54% | 42% |
| 計 | 45% | 77% | 63% |