

フィールド（現場）検定成績 「忠茂丸」

	性別	母の父	母母の父	生年月日	導入 年月日	開始 日齢	開始 体重	出荷先	出荷 年月日	肥育 日数	出荷 体重	枝肉 重量	ロース 芯	バラ 厚	皮下 脂肪	推定 歩留	BMS NO	BCS NO	格 付
1	去	金幸	平茂勝	H18.3.5	H18.11.27	267	314	ナンチク	H20.8.12	624	700	447.6	50	8.8	2.0	74.4	10	4	A-5
2	去	隆茂福	忠福	H18.3.12	H18.12.19	282	287	ナンチク	H20.8.7	597	714	451.5	53	8.5	1.5	74.9	9	3	A-5
3	去	忠菊	糸藤	H18.6.10	H19.4.10	304	300	京都	H20.11.30	600	792	539.7	51	9.2	2.9	72.8	9	3	B-5
4	去	忠福	宝勝	H18.3.14	H18.12.20	281	314	ナンチク	H20.8.17	606	701	433.4	49	8.5	2.2	74.1	5	4	A-4
5	去	糸藤	宝勝	H18.8.27	H19.5.31	277	250		H20.12.11	560	786	513.1	50	9.1	3.2	72.7	5	5	A-4
6	去	神高福	第15気高	H18.2.20	H18.12.20	303	275	有明ミート	H20.9.28	648		416.0	46	7.1	1.5	73.6	5	4	A-3
去 平均		6				286	290			597	739	466.9	50	8.5	2.2	73.8	7.2		
1	雌	金徳	但馬福	H18.3.10	H18.12.21	286	262		H20.7.3	560		361.1	50	7.5	3.6	73.2	6	4	A-4
2	雌	神徳福	糸晴	H18.2.19	H18.11.28	282	307	ナンチク	H20.8.17	628	767	503.4	56	7.8	2.7	73.2	6	5	A-4
3	雌	神高福	第20平茂	H18.3.4	H18.12.21	292	275		H20.7.15	572		390.8	50	7.0	2.8	73.2	5	4	A-4
4	雌	神高福	初見	H18.2.22	H18.11.30	281	260	ナンチク	H20.7.14	592	649	413.7	48	8.7	3.1	73.5	5	5	A-3
5	雌	宝政	神高福	H18.3.2	H18.11.29	272	279		H20.7.24	603		450.2	48	7.2	2.7	72.5	4	5	A-3
6	雌	糸藤	金一	H18.2.18	H18.11.30	285	300	名古屋食肉	H20.7.17	595		515.8	54	7.4	2.1	73.1	4	4	A-3
7	雌	宝政	金徳	H18.2.24	H18.11.30	279	281	ナンチク	H20.8.24	633	757	485.4	54	8.0	2.5	73.5	4	4	A-3
8	雌	神高福	宝勝	H18.2.28	H18.11.27	272	304	名古屋食肉	H20.5.13	533		530.6	47	8.3	3.5	71.3	3	4	B-3
9	雌	糸藤	但馬福	H18.3.18	H18.12.20	277	279	阿久根センター	H20.11.2	683	586	333.1	52	6.3	1.6	74.7	3	4	A-2
雌 平均		9				281	283			600	690	442.7	51	7.6	2.7	73.1	4.4		
全体の平均		15				283	286			602	717	452.4	51	8.0	2.5	73.4	5.5		

	去勢	雌	全体
5率	50%	0%	20%
4率	33%	33%	33%
計	83%	33%	53%