

よろん

検定した種雄牛

与論

(黒原4373)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成13年10月22日生

産地

曾於市 大隅町

血統

金 幸 黒原 2865 ゆきこ2 黒原 846525	金 徳 黒高 939	かよこ 黒高 130038	金水9	黒育 43
			とみひら	黒原 187403
	富金 黒原 1640	ゆきこ 黒原 663344	神高福	黒高 929
			かおよ5	黒高 115466
			金水9	黒育 43
			とみひら	黒原 187403
			忠福	黒高 129
			とみまさ	黒原 559568

調査牛及び成績

検定期間

平成17年4月25日～平成18年4月24日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	天 城	戦 闘	正 志	敏 夫	与 作	夏 樹	嶺	立 長	
個体識別番号	12100 3792 3	12099 2434 0	12101 3872 9	12099 2187 5	12094 1936 5	12093 1459 2	12102 3817 7	12051 4666 1	
生年月日	H16.08.15	H16.08.10	H16.08.03	H16.07.31	H16.07.26	H16.07.22	H16.07.20	H16.07.19	
母の父	神高福	神高福	高 栄	谷 照	糸 藤	福美勝	平茂勝	神高福	
母の祖父	宝 勝	第5平茂	第20平茂	平茂勝	神高福	平茂勝	紋次郎	富 金	
母の祖々父	若 藤	田安森3	田安福	神高福	金 豊	神高福	第20平茂	田安福	
生産地	天城町	伊仙町	和泊町	徳之島町	喜界町	笠利町	与論町	知名町	
開始時日齢	253	258	265	268	273	277	279	280	269.1
開始時体重	267.0	239.0	261.0	253.0	270.0	262.0	266.0	247.0	258.1
終了時体重	696.0	634.0	560.0	618.0	710.0	658.0	702.0	620.0	649.8
D . G	1.18	1.09	0.82	1.00	1.21	1.09	1.20	1.02	1.08
体 高	141.6	141.6	140.2	141.4	144.0	140.4	141.0	139.0	141.2
胸 囲	224.0	213.0	201.0	206.0	226.0	217.0	220.0	207.0	214.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,819
	粗飼料 (Kg)								664
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.20
	"								1.70
	"								0.82
	"								6.05
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	660.0	604.0	528.0	600.0	683.0	634.0	678.0	594.0	622.6
枝肉量・温	439.0	376.0	343.0	366.5	452.5	410.5	434.0	376.0	399.7
歩留・温	66.5	62.3	65.0	61.1	66.3	64.7	64.0	63.3	64.2
冷屠体重量	436	373	341	363	450	407	430	373	397
バラの厚さ	7.7	6.6	5.8	6.9	7.2	6.8	7.2	6.7	6.9
皮下脂肪	4.6	1.7	2.5	1.9	3.5	1.6	3.8	2.7	2.8
筋間脂肪	7.2	5.5	4.6	5.5	5.4	6.9	5.6	4.9	5.7
ロース芯面積	48	43	41	47	49	51	48	44	46
推定歩留	71.3	73.2	72.2	73.9	71.8	74.1	71.7	72.5	72.6
歩留等級	B	A	A	A	B	A	B	A	A
脂肪交雑	3	1+	2	4	3	5	3-	4	3.1
肉質等級	5	3	3	5	5	5	4	5	4.4
枝肉番号	4992	4993	4994	4995	4996	4997	4998	4999	

たにきよてる

検定した種雄牛

谷清照

(黒原4312)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成13年4月28日生

産地

鹿児島市

血統	谷 照 黒原 2376	菊照土井 黒育 100	菊則土井 黒育 32	とくかね 黒高 20988
	なりさ 黒原 857042	金 徳 黒高 939	金水9 黒育 43	とみひら 黒原 187403

調査牛及び成績

検定期間

平成17年4月27日～平成18年4月26日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	太 郎	照 福	幸 太 郎	久 下	幸 照	照 男	谷 照	勝 照	
個体識別番号	12096 4711 9	12088 6860 7	12146 0953 9	11868 6328 1	12088 7412 7	12088 6712 9	12088 6690 0	11868 6955 9	
生年月日	H16.08.12	H16.08.10	H16.08.08	H16.08.07	H16.08.05	H16.07.30	H16.07.19	H16.07.18	
母の父	平 茂 勝	第5隼福	神 高 福	平 茂 勝	平 茂 勝	金 幸	金 幸	平 茂 勝	
母の祖父	忠 福	第20平茂	平 茂 勝	忠 福	神 高 福	平 茂 勝	平 茂 勝	神 高 福	
母の祖々父	第20平茂	忠 福	忠 福	第20平茂	第20平茂	神 高 福	忠 福	第20平茂	
生 産 地	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	さつま町	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	さつま町	
開始時日齢	258	260	262	263	265	271	282	283	268.0
開始時体重	236.0	240.0	241.0	266.0	277.0	261.0	248.0	275.0	255.5
終了時体重	580.0	532.0	558.0	656.0	674.0	554.0	570.0	698.0	602.8
D . G	0.95	0.80	0.87	1.07	1.09	0.80	0.88	1.16	0.95
体 高	139.0	132.4	138.0	140.4	139.0	136.4	137.0	146.0	138.5
胸 囲	208.0	210.0	205.0	223.0	217.0	215.0	203.0	224.0	213.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,648
	粗飼料 (Kg)								587
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.63
	"								1.69
	"								0.86
	"								6.35
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	560.0	530.0	534.0	636.0	652.0	528.0	552.0	675.0	583.4
枝肉量・温	350.0	340.0	349.0	414.0	407.5	348.0	339.5	444.0	374.0
歩留・温	62.5	64.2	65.4	65.1	62.5	65.9	61.5	65.8	64.1
冷屠体重量	348	338	346	411	404	346	338	441	372
バラの厚さ	6.1	6.9	6.0	7.3	6.2	6.1	6.0	7.2	6.5
皮下脂肪	1.8	2.5	2.6	3.3	2.2	3.0	1.8	2.1	2.4
筋間脂肪	6.3	7.5	7.3	8.0	6.9	6.3	5.6	7.6	6.9
ロース芯面積	46	46	48	55	56	46	41	56	49
推定歩留	73.5	73.5	73.0	73.3	73.8	72.5	72.9	74.1	73.3
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	4	3-	4	4	5	2+	4	3.6
肉質等級	5	5	5	5	5	5	4	5	4.9
枝肉番号	5106	5107	5108	5109	5110	5111	5112	5113	

かつゆりやま

検定した種雄牛

勝百合山

(黒原4370)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成13年8月20日 生

産地

肝属郡 南大隅町

血統	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育 134	気高 黒育 9
		ふくみ 黒高 106567	第13ひらしげ 黒高 16819
	しらゆり4の2 黒原 871992	神高福 黒高 929	宝勝 黒育 175
		しらゆり4 黒原 731116	はつこ 黒原 156592
			忠福 黒育 129
			めぐみ 黒高 69294
			金光 黒高 893
			しらゆり 黒原 110600

調査牛及び成績

検定期間

平成17年6月8日～平成18年6月7日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	富一郎	浜西	勝百合	勝山	秀作	蔵114之9	勝山	太郎1	
個体識別番号	12089 3076 2	12089 3242 1	12086 4568 0	12088 4240 9	12087 0453 0	12091 3566 1	12087 2548 1	12088 4359 8	
生年月日	H16.9.18	H16.9.18	H16.9.18	H16.9.13	H16.9.10	H16.9.8	H16.8.25	H16.8.23	
母の父	神高福	神徳福	神高福	神高福	糸藤	第20平茂	忠平茂	勝美	
母の祖父	第20平茂	第20平茂	平茂勝	鹿秀土井	忠福	神高福	第20平茂	第20平茂	
母の祖々父	鹿秀土井	田安福	神高福	第20平茂	隼信	金水9	白金9	気高	
生産地	鹿屋市 萩塚町	鹿屋市 浜田町	鹿屋市 串良町	肝属郡 東串良町	肝属郡 南大隅町	肝属郡 肝付町	肝属郡 南大隅町	肝属郡 東串良町	
開始時日齢	263	263	263	268	271	273	287	289	272.1
開始時体重	293.0	255.0	253.0	237.0	288.0	277.0	284.0	288.0	271.9
終了時体重	720.0	686.0	630.0	624.0	662.0	708.0	650.0	704.0	673.0
D.G	1.17	1.18	1.04	1.06	1.03	1.18	1.01	1.14	1.10
体高	140.0	141.6	137.0	138.0	137.6	143.0	140.0	147.4	140.6
胸囲	230.0	218.0	221.0	217.0	223.0	219.0	219.0	218.0	220.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,020
	粗飼料 (Kg)								605
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.53
	"								1.51
	"								0.84
	"								6.19
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	695.0	656.0	602.0	596.0	630.0	674.0	616.0	670.0	642.4
枝肉量・温	438.5	408.5	397.5	377.5	413.5	432.0	401.0	436.0	413.1
歩留・温	63.1	62.3	66.0	63.3	65.6	64.1	65.1	65.1	64.3
冷屠体重量	434	403	393	372	409	426	396	431	408
バラの厚さ	6.9	6.3	8.2	6.6	7.0	7.0	7.7	7.0	7.1
皮下脂肪	3.2	2.0	3.4	2.4	2.2	2.7	2.0	2.9	2.6
筋間脂肪	7.7	5.4	8.0	6.9	7.5	5.9	7.4	7.3	7.0
ロース芯面積	47	54	44	51	55	52	60	53	52
推定歩留	71.9	73.8	72.7	73.6	74.2	73.1	75.6	73.0	73.5
歩留等級	B	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	5	3	4	5	3-	5	3	3.8
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	6577	6578	6579	6580	6581	6582	6583	6584	

ゆきひらふじ

検定した種雄牛

幸平藤

(黒原 4 3 7 2)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成13年8月18日 生

産地

曾於郡 大崎町

血統

金 幸 黒原 2865 ゆうこ5 黒原 635588	金 徳 黒高 939	かよこ 黒高 130038	金水9	黒育 43
			とみひら	黒原 187403
	但馬福 黒育 176	ゆうこ 黒原 337416	神高福	黒高 929
			かおよ5	黒高 115466
			安美土井	黒育 48
			よしまつ	黒育 2513
			宝徳	黒育 128
			はなこ2	黒原 80031

調査牛及び成績

検定期間

平成17年6月1日～平成18年5月31日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	神 幸	幸 平	藤 栄	幸 平	和 幸	浩 太 郎	忠 平	幸 平	
個体識別番号	12087 6233 2	12087 5788 8	12085 7405 8	12082 5232 1	12092 4698 5	12092 4685 5	12090 4806 0	12085 2275 2	
生年月日	H16. 9. 13	H16. 9. 12	H16. 9. 10	H16. 9. 5	H16. 9. 1	H16. 8. 23	H16. 8. 22	H16. 8. 16	
母の父	神高福	宝 政	平茂勝	糸 藤	但馬福	神高福	神高福	平茂勝	
母の祖父	糸 藤	忠 福	神高福	忠 福	宝 勝	宝 勝	宝 勝	安福165の9	
母の祖父父	安美福	栄 明	第20平茂	宝 勝	豊 川	豊 福	雄 宏	金 徳	
生産地	志布志市 有明町	志布志市 有明町	曾於市 大隅町	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	鹿屋市 輝北町	曾於市 末吉町	
開始時日齢	261	262	264	269	273	282	283	289	272. 9
開始時体重	283. 0	242. 0	263. 0	265. 0	264. 0	307. 0	299. 0	304. 0	278. 4
終了時体重	640. 0	626. 0	644. 0	580. 0	602. 0	742. 0	794. 0	688. 0	664. 5
D . G	0. 98	1. 05	1. 05	0. 87	0. 93	1. 20	1. 36	1. 05	1. 06
体 高	139. 6	135. 4	138. 2	135. 4	134. 0	143. 2	141. 0	140. 4	138. 4
胸 囲	215. 0	211. 0	212. 0	205. 0	205. 0	222. 0	232. 0	216. 0	214. 8
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2, 837
	粗 飼 料 (Kg)								486
飼料要求率	1Kg増体に要した								7. 35
	"								1. 26
	"								0. 81
	"								5. 92
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	615. 0	605. 0	618. 0	554. 0	580. 0	714. 0	768. 0	662. 0	639. 5
枝肉量・温	392. 5	386. 0	404. 5	359. 0	377. 5	464. 5	503. 5	433. 0	415. 1
歩 留・温	63. 8	63. 8	65. 5	64. 8	65. 1	65. 1	65. 6	65. 4	64. 9
冷屠体重量	388	381	400	355	372	457	497	428	410
バラの厚さ	7. 0	6. 4	7. 7	7. 2	5. 8	7. 6	8. 0	7. 3	7. 1
皮下脂肪	2. 7	2. 6	2. 6	2. 3	2. 2	2. 2	3. 2	2. 6	2. 6
筋間脂肪	6. 8	6. 3	7. 0	6. 4	6. 0	7. 3	7. 6	6. 2	6. 7
ロース芯面積	45	47	51	47	50	67	57	45	51
推定歩留	72. 7	72. 7	73. 9	73. 8	73. 2	75. 5	73. 1	72. 4	73. 4
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3-	2	4	3	3	3	5	4	3. 3
肉質等級	4	3	5	5	5	5	5	5	4. 6
枝肉番号	6375	6376	6377	6378	6379	6380	6381	6382	

みちてる

検定した種雄牛

美千照

(黒原 4 4 4 9)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成14年1月22日 生

産 地

鹿児島市

血 統

谷 照 黒原 2376 ちよみ32の3 黒原 1080291	{	菊照土井 黒育 100	{	菊則土井 黒育 32	{	とくかね 黒高 20988
		たにひめ 黒育 17846		安谷土井 黒育 85		たにづるひめ 黒育 11116
	{	平茂勝 黒原 2441	{	第20平茂 黒育 134	{	ふくみ 黒高 106567
		ちよみ3の2 黒原 788293		忠福 黒育 129		ちよみ3 黒原 657553

調査牛及び成績

検定期間

平成17年12月12日～平成18年12月11日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均	
名 号	糸 照	照 太郎	照之助	勇 人	常 盤	朝 夫	照 幸	照 幸		
個体識別番号	12085 3765 7	12092 6776 8	12087 6965 2	12087 6996 6	12093 5067 5	12087 7196 9	12085 4858 5	12090 6083 3		
生年月日	H17.03.19	H17.03.16	H17.03.08	H17.03.05	H17.03.04	H17.03.02	H17.03.01	H17.02.28		
母の父	糸 藤	金 幸	神高福	第5隼福	平茂勝	忠 菊	金 幸	金 幸		
母の祖父	富 金	平茂勝	第20平茂	宝 政	第15金水	宏 勝	忠 福	北国7の8		
母の祖々父	忠 福	神高福	宝 勝	第20平茂	宝 徳	第5金水	第20平茂	神高福		
生 産 地	曾於市 末吉町	曾於郡 大崎町	志布志市 有明町	志布志市 有明町	志布志市 松山町	志布志市 有明町	曾於市 末吉町	鹿屋市 輝北町		
開始時日齢	268	271	279	282	283	285	286	287	280.1	
開始時体重	275.0	263.0	269.0	276.0	286.0	265.0	274.0	260.0	271.0	
終了時体重	631.0	651.0	605.0	617.0	683.0	626.0	566.0	618.0	624.6	
D . G	0.98	1.07	0.92	0.94	1.09	0.99	0.80	0.98	0.97	
体 高	143.0	136.0	139.0	136.0	141.0	137.0	138.0	136.4	138.3	
胸 囲	208.0	220.0	216.0	215.0	222.0	218.0	208.0	213.0	215.0	
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,760	
	粗 飼 料 (Kg)								568	
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.81	
	"								粗 飼 料 (Kg)	1.61
	"								D C P (Kg)	0.88
	"								T D N (Kg)	6.44
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8		
屠殺前体重	604.0	632.0	580.0	606.0	657.0	602.0	546.0	600.0	603.4	
枝肉量・温	375.0	410.0	377.5	384.5	412.5	391.0	341.5	379.5	383.9	
歩 留・温	62.1	64.9	65.1	63.4	62.8	65.0	62.5	63.3	63.6	
冷屠体重量	371	405	373	380	408	387	337	376	380	
バラの厚さ	6.8	7.8	7.6	7.6	7.1	7.8	5.7	6.8	7.2	
皮下脂肪	1.7	3.1	2.8	2.3	2.4	1.8	1.9	1.9	2.2	
筋間脂肪	6.2	6.8	6.8	5.7	6.8	6.0	5.7	7.2	6.4	
ロース芯面積	48	61	52	51	53	56	53	56	54	
推定歩留	74.0	74.7	74.1	74.3	73.8	75.4	74.2	74.8	74.4	
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
脂肪交雑	2+	4	4	5	3	4	3	5	3.8	
肉質等級	4	5	4	5	4	5	5	5	4.6	
枝肉番号	6969	6970	6971	6972	6973	6974	6975	6976		

ますかねひら

検定した種雄牛


益金平
(ET)

(黒原4481)
平成14年4月8日生

繋養者
産地

鹿児島県肉用牛改良研究所
鹿屋市 串良町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成17年11月28日～平成18年11月27日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	益 金	金平勝	神益平	益 金	益五月	益 平	益 金	益	
個体識別番号	12095 8978 5	11169 8022 4	11968 8397 2	12095 6566 6	12095 7448 4	12095 7101 8	12095 5990 0	12095 4709 9	
生年月日	H17.03.13	H17.03.10	H17.03.07	H17.03.01	H17.03.01	H17.02.17	H17.02.17	H17.02.15	
母の父	第2平茂勝	平茂勝	神高福	平茂勝	安平	第5隼福	平茂勝	忠福	
母の祖父	金徳	神高福	糸晴	第5隼福	福茂	宝政	神高福	第20平茂	
母の祖々父	忠菊	第20平茂	忠福	第20平茂	隆美	忠福	第20平茂	忠福	
生産地	霧島市 溝辺町	始良郡 湧水町	始良郡 蒲生町	始良郡 加治木町	霧島市 国分	霧島市 国分	霧島市 牧園町	始良郡 湧水町	
開始時日齢	260	263	266	272	272	284	284	286	273.4
開始時体重	279.0	315.0	243.0	317.0	262.0	276.0	241.0	317.0	281.3
終了時体重	626.0	728.0	544.0	696.0	586.0	688.0	621.0	703.0	649.0
D . G	0.95	1.13	0.83	1.04	0.89	1.13	1.04	1.06	1.01
体 高	135.0	140.4	135.6	137.2	136.8	137.2	136.6	139.4	137.3
胸 囲	216.0	224.0	205.0	220.0	210.0	215.0	218.0	217.0	215.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,803
	粗飼料 (Kg)								578
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.62
	"								1.57
	"								0.86
	"								6.29
	D C P (Kg)								
	T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	603.0	710.0	528.0	665.0	576.0	678.0	597.0	674.0	628.9
枝肉量・温	393.5	467.0	340.5	437.5	368.0	431.5	392.5	430.5	407.6
歩留・温	65.3	65.8	64.5	65.8	63.9	63.6	65.7	63.9	64.8
冷屠体重量	389	462	337	433	364	427	389	425	403
バラの厚さ	7.9	7.2	6.4	7.5	6.8	7.5	7.2	7.4	7.2
皮下脂肪	3.0	1.7	1.9	2.7	1.6	2.5	2.7	2.1	2.3
筋間脂肪	7.3	7.1	5.6	7.6	5.9	5.6	7.1	7.2	6.7
ロース芯面積	49	63	48	49	57	53	51	48	52
推定歩留	73.5	75.1	74.1	73.0	75.5	73.8	73.6	73.5	74.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	5	4	5	4	3	4	4	4.3
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	5778	5779	5780	5781	5782	5783	5784	5785	

こうたろう

検定した種雄牛

光太郎

(黒原 4 4 7 9)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成14年7月20日 生

産地

伊佐郡 菱刈町

血統

平茂勝
黒原 2441

ますひかり
黒原 806743

第20平茂

黒育 134

ふくみ

黒高 106567

紋次郎

黒高 938

はつひかり

黒原 705359

気高

黒育 9

第13ひらしげ

黒高 16819

宝勝

黒育 175

はつこ

黒原 156592

安美土井

黒育 48

はるみ

黒高 29888

第20平茂

黒育 134

ながひめ

黒原 617916

調査牛及び成績

検定期間

平成17年12月19日～平成18年12月18日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	光太	光次郎	光福	4金太	功	神太	光太	春光	
個体識別番号	12086 4091 3	12366 8585 6	12098 6273 4	12098 6351 9	12366 8520 7	12098 6212 3	12366 8545 0	12082 7906 9	
生年月日	H17.04.10	H17.04.01	H17.03.30	H17.03.30	H17.03.24	H17.03.17	H17.03.16	H17.03.07	
母の父	忠福	第5隼福	神高福	神高福	金幸	神高福	神高福	安糸福	
母の祖父	第20平茂	平茂勝	北国7の3	藤勝	平茂勝	第20気高	金豊	第20平茂	
母の祖々父	藤花	忠福	第20平茂	豊川	金鶴	第2金水	福栄	忠福	
生産地	西之表市	熊毛郡 南種子町	熊毛郡 中種子町	熊毛郡 中種子町	熊毛郡 南種子町	熊毛郡 中種子町	熊毛郡 南種子町	西之表市	
開始時日齢	253	262	264	264	270	277	278	287	269.4
開始時体重	209.0	233.0	267.0	268.0	276.0	255.0	268.0	236.0	251.5
終了時体重	606.0	594.0	666.0	664.0	622.0	612.0	638.0	586.0	623.5
D.G	1.09	0.99	1.10	1.09	0.95	0.98	1.02	0.96	1.02
体高	136.0	137.0	139.0	137.0	136.4	136.0	141.0	137.0	137.4
胸囲	212.0	205.0	225.0	222.0	220.0	218.0	214.0	208.0	215.5
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,780
	粗飼料 (Kg)								444
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.47
	"								1.19
	"								0.82
	"								5.98
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	587.0	575.0	642.0	653.0	608.0	602.0	614.0	565.0	605.8
枝肉量・温	381.0	358.5	397.0	415.5	400.5	384.0	383.5	356.0	384.5
歩留・温	64.9	62.3	61.8	63.6	65.9	63.8	62.5	63.0	63.5
冷屠体重量	377	354	393	411	396	381	378	351	380
バラの厚さ	6.9	6.3	7.5	8.1	7.5	7.2	6.2	6.1	7.0
皮下脂肪	1.9	1.5	3.0	2.1	2.0	3.4	2.1	2.1	2.3
筋間脂肪	6.4	5.3	5.5	6.7	6.2	6.5	5.1	5.5	5.9
ロース芯面積	48	52	55	57	50	46	50	50	51
推定歩留	73.9	74.6	74.0	75.3	74.2	72.4	73.4	73.8	74.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3-	4	5	4	5	3	3-	3-	3.6
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	7496	7497	7498	7499	7500	7501	7502	7503	

やすあき

検定した種雄牛

安 明

(黒原 4 4 7 8)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成14年8月1日 生

産 地

鹿児島市

血 統

安 平 黒原 2208 せつあき 2 黒原 1080349	安福 黒原 1255 きよふく 黒原 568518	田安土井 黒育 6 かずよ 黒高 51489

調査牛及び成績

検定期間

平成17年12月14日～平成18年12月13日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	中野177	安 海	高 明	良 多	実験227	咲 安	町田14	安 富	
個体識別番号	12084 5045 1	12081 0807 9	12097 6183 9	12151 0583 2	11225 0409 4	12154 0860 5	12097 4922 6	11871 0885 5	
生年月日	H17.04.07	H17.03.29	H17.03.29	H17.03.28	H17.03.27	H17.03.24	H17.03.17	H17.03.05	
母の父	平茂勝	金 幸	神高福	金 幸	宝 政	神高福	平茂勝	平茂勝	
母の祖父	菊 勝	平茂勝	第20平茂	安 福	忠 福	安 平	忠 福	富 金	
母の祖々父	第20平茂	神高福	第2金水	安 波	第20平茂	安 隆	北国7の3	神高福	
生 産 地	指宿市 山川町	鹿児島市 吉野町	出水市 高尾野町	鹿児島市 本名町	出水郡 長島町	日置市 東市来町	出水郡 長島町	南さつま市 大浦町	
開始時日齢	251	260	260	261	262	265	272	284	264.4
開始時体重	240.0	246.0	256.0	264.0	222.0	226.0	244.0	285.0	247.9
終了時体重	610.0	562.0	636.0	554.0	570.0	584.0	578.0	618.0	589.0
D . G	1.02	0.87	1.04	0.80	0.96	0.98	0.92	0.91	0.94
体 高	138.4	132.0	136.4	129.0	131.4	133.0	131.0	131.0	132.8
胸 囲	216.0	209.0	220.0	205.0	211.0	206.0	208.0	219.0	211.8
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,700
	粗 飼 料 (Kg)								527
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.92
	" " " " " " " "								1.54
	" " " " " " " "								0.88
	" " " " " " " "								6.48
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	584.0	550.0	614.0	530.0	552.0	570.0	548.0	594.0	567.8
枝肉量・温	377.5	356.5	409.5	346.0	361.5	360.5	354.5	374.0	367.5
歩 留・温	64.6	64.8	66.7	65.3	65.5	63.2	64.7	63.0	64.7
冷屠体重量	373	352	405	343	358	357	351	370	364
バラの厚さ	7.2	6.2	7.3	7.4	7.7	6.6	6.3	6.6	6.9
皮下脂肪	2.5	2.1	3.5	2.5	3.0	2.3	2.1	2.4	2.6
筋間脂肪	6.7	5.9	6.5	6.5	6.7	6.4	6.4	6.1	6.4
ロース芯面積	50	46	41	46	45	56	51	58	49
推定歩留	73.8	73.3	71.5	73.8	73.2	74.6	74.0	74.6	73.6
歩留等級	A	A	B	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	3-	3	5	5	4	3	5	4.1
肉質等級	5	4	5	5	5	5	5	5	4.9
枝肉番号	7177	7178	7179	7180	7181	7182	7183	7184	

ぎんが
銀河 (黒原4483) 繫養者 鹿兒島県肉用牛改良研究所
平成14年6月14日生 産地 肝属郡 肝付町

血統

- 金 幸 黒原2865
 - 金 徳
 - 黒高 939
 - かよこ
 - 黒高 130038
 - 安 平 黒原 2208
 - ふくしげこ
 - 黒原 862788
- ふくこ 黒原 1003260
 - 金水9 黒育 43
 - とみひら 黒原 187403
 - 神高福 黒高 929
 - かおよ5 黒高 115466
 - 安福 黒原 1255
 - きよふく 黒原 568518
 - 隆美 黒育 161
 - ふくしげ 黒原 142727

調査牛及び成績 検定期間 平成18年1月25日～平成19年1月24日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	銀 次	銀之助	銀太郎	金十郎	連225	山健82	恵比寿 504	福 一	
個体識別番号	12087 2946 5	12087 0929 0	12086 8951 6	12089 3671 9	12091 4042 9	12089 1147 1	12051 6000 1	12083 1455 5	
生年月日	H17.05.05	H17.05.05	H17.05.04	H17.04.25	H17.04.25	H17.04.22	H17.04.17	H17.04.12	
母の父	糸 藤	福美勝	金 幸	北国7の3	宝 政	平茂勝	平茂勝	第5隼福	
母の祖父	第20平茂	平茂勝	神高福	第20平茂	忠 福	糸 福	忠 福	北国7の3	
母の祖々父	田安福	神高福	第20平茂	春 寛	第20平茂	福鶴57	第15気高	第20平茂	
生産地	肝属郡 南大隅町	肝属郡 南大隅町	肝属郡 東串良町	鹿屋市	肝属郡 肝付町	鹿屋市	垂水市	肝属郡 錦江町	
開始時日齢	265	265	266	275	275	278	283	288	274.4
開始時体重	283.0	264.0	259.0	318.0	312.0	311.0	254.0	296.0	287.1
終了時体重	724.0	628.0	630.0	696.0	676.0	620.0	694.0	618.0	660.8
D . G	1.21	1.00	1.02	1.04	1.00	0.85	1.21	0.88	1.03
体 高	144.4	137.0	134.0	138.0	140.0	133.0	139.0	134.0	137.4
胸 囲	222.0	218.0	220.0	221.0	227.0	209.0	224.0	220.0	220.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,969 626
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " D C P (Kg) " T D N (Kg)								7.95 1.67 0.89 6.57
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	692.0	607.0	606.0	678.0	626.0	603.0	664.0	598.0	634.3
枝肉量・温	445.5	385.5	396.0	446.0	428.0	384.0	431.0	386.5	412.8
歩留・温	64.4	63.5	65.3	65.8	68.4	63.7	64.9	64.6	65.1
冷屠体重量	440	382	391	441	423	380	425	382	408
バラの厚さ	7.5	7.4	7.3	8.0	7.9	6.5	8.2	8.0	7.6
皮下脂肪	3.2	1.9	3.6	2.7	3.3	1.3	3.4	2.9	2.8
筋間脂肪	6.1	6.9	6.2	6.2	6.8	5.7	6.6	6.7	6.4
ロース芯面積	48	59	57	58	46	47	54	46	52
推定歩留	72.3	75.5	73.6	74.4	72.5	73.9	73.5	73.4	73.6
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3-	4	4	5	3-	3	4	4	3.7
肉質等級	4	5	5	5	4	5	5	5	4.8
枝肉番号	447	448	449	450	451	452	453	454	