

検定した種雄牛

隆伍 1 (ET) (黒原 4 4 5 0)
平成14年3月7日 生

繋養者
産 地

鹿児島県肉用牛改良研究所
曾於市 大隅町

血 統	金 幸 黒原2865	金 徳 黒高 939	金水 9 黒育 43	とみひら 黒原 187403
		かよこ 黒高 130038	神高福 黒高 929	かおよ 5 黒高 115466
	なつあきこ 黒原814238	紋次郎 黒高 938	安美土井 黒育 48	はるみ 黒高 29888
		あきこ 1 の 2 黒原 718913	第 2 0 平 茂 黒育 134	あきこの 1 黒高 113422

調査牛及び成績 検定期間 平成18年5月8日～平成19年5月7日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	隆 勝	隆 次	隆 桜	一 郎	隆 伍	伍 男	茂 幸	七 雄	
個体識別番号	12155 7520 8	12096 6457 4	1118 8220 5	1113 9478 4	1113 9267 4	1113 9106 6	1113 9205 6	12155 7973 2	
生年月日	H17.08.10	H17.08.09	H17.08.08	H17.08.08	H17.08.01	H17.07.30	H17.07.25	H17.07.23	
母の父	平 茂 勝	神 徳 福	第 5 隼 福	平 茂 勝	糸 晴	平 茂 勝	平 茂 勝	平 茂 勝	
母の祖父	神 高 福	第 20 平 茂	神 高 福	神 高 福	忠 福	第 5 隼 福	神 高 福	田 安 春	
母の祖々父	金 一	但 馬 福	第 5 気 高	第 20 平 茂	宝 徳	第 20 平 茂	第 20 平 茂	旭	
生 産 地	薩 摩 郡 さ つ ま 町	薩 摩 郡 さ つ ま 町	薩 摩 郡 さ つ ま 町	薩 摩 川 内 市	薩 摩 川 内 市	薩 摩 川 内 市	薩 摩 川 内 市	薩 摩 川 内 市	
開始時日齢	271	272	273	273	280	282	287	289	278.4
開始時体重	298.0	235.0	299.0	297.0	322.0	285.0	311.0	318.0	295.6
終了時体重	776.0	636.0	732.0	712.0	750.0	712.0	782.0	742.0	730.3
D . G	1.31	1.10	1.19	1.14	1.18	1.17	1.29	1.16	1.19
体 高	143.0	137.2	140.2	140.9	140.6	143.2	144.2	147.4	142.1
胸 囲	225.0	211.0	221.0	218.0	224.0	221.0	223.0	216.0	219.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,308
	粗飼料 (Kg)								520
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.61
	" 濃厚飼料 (Kg)								1.20
	" 粗飼料 (Kg)								0.83
	" D C P (Kg)								6.08
	" T D N (Kg)								
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	734.0	602.0	693.0	678.0	708.0	686.0	743.0	702.0	693.3
枝肉量・温	488.5	398.0	447.0	451.0	475.5	452.0	470.0	460.0	455.3
歩留・温	66.6	66.1	64.5	66.5	67.2	65.9	63.3	65.5	65.7
冷屠体重量	484	394	443	447	470	447	464	454	450
バラの厚さ	8.6	7.3	8.4	8.3	8.6	7.5	8.9	7.0	8.1
皮下脂肪	2.7	2.6	2.2	1.9	3.4	3.0	1.8	2.3	2.5
筋間脂肪	7.4	6.4	6.8	6.8	6.5	7.0	7.3	6.2	6.8
ロース芯面積	55	53	62	47	55	50	55	57	54
推定歩留	73.9	73.9	75.6	73.8	73.4	72.7	75.1	73.8	74.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	3	5	5	3-	2+	4	3-	3.5
肉質等級	5	5	5	5	5	4	5	4	4.8
枝肉番号	4478	4479	4480	4481	4482	4483	4484	4485	

検定した種雄牛

新世界

(黒原4505)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成14年9月4日生

産地

鹿児島市 直木町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成18年5月31日～平成19年5月30日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	新界	三千世界	新世界1	新吉	世界一	美仁	桃桜	世界一	
個体識別番号	01130 6735 8	01129 9584 3	01110 3258 7	12099 3701 2	12153 2923 8	01115 5436 2	01129 9630 7	01122 6167 2	
生年月日	H17.09.26	H17.09.20	H17.09.14	H17.09.05	H17.08.30	H17.08.26	H17.08.21	H17.08.19	
母の父	平茂勝	第5隼福	神高福	北国7の3	神高福	神高福	隆茂福	神高福	
母の祖父	神高福	第20平茂	糸晴	安谷福	金徳	糸晴	神高福	北国7の3	
母の祖々父	第20平茂	忠福	気高栄	吉1	宝徳	安谷福	第22平茂	忠福	
生産地	大島郡 天城町	大島郡 伊仙町	大島郡 知名町	大島郡 伊仙町	大島郡 喜界町	大島郡 和泊町	大島郡 徳之島町	大島郡 与論町	
開始時日齢	247	253	259	268	274	278	283	285	268.4
開始時体重	252.0	221.0	251.0	261.0	259.0	264.0	288.0	264.0	257.5
終了時体重	634.0	592.0	598.0	598.0	612.0	566.0	724.0	666.0	623.8
D.G	1.05	1.02	0.95	0.93	0.97	0.83	1.20	1.10	1.01
体高	134.0	131.0	137.0	133.4	136.0	136.0	138.0	138.0	135.4
胸囲	212.0	210.0	210.0	208.0	214.0	206.0	224.0	211.0	211.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,824
	粗飼料 (Kg)								579
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.71
	"								1.58
	"								0.87
	"								6.35
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	623.0	568.0	575.0	566.0	584.0	546.0	694.0	644.0	600.0
枝肉量・温	400.0	362.0	365.5	370.0	384.5	345.5	450.0	404.0	385.2
歩留・温	64.2	63.7	63.6	65.4	65.8	63.3	64.8	62.7	64.2
冷屠体重量	395	358	362	366	380	341	444	398	381
バラの厚さ	7.4	6.0	6.8	6.5	7.8	6.7	8.0	7.0	7.0
皮下脂肪	1.8	2.4	3.2	2.4	1.6	2.5	3.0	1.7	2.3
筋間脂肪	6.5	6.0	5.9	5.2	6.7	5.5	6.0	5.3	5.9
ロース芯面積	49	42	49	39	57	40	45	53	47
推定歩留	74.1	72.3	73.0	72.1	75.8	72.6	72.4	74.5	73.4
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	5	4	3-	5	3	2	4	3.7
肉質等級	5	5	5	4	4	4	3	5	4.4
枝肉番号	5450	5451	5452	5453	5454	5455	5456	5457	

検定した種雄牛

吾平藤

(黒原4503)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成14年9月5日生

産地

鹿屋市 吾平町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成18年5月31日～平成19年5月30日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	響	蔵120 乃9	金一	和美1	吾藤	福藤	藤太郎	海史	
個体識別番号	01121 54677	11352 52685	01112 97870	01112 96422	12087 33721	12087 09917	01131 77194	01121 52734	
生年月日	H17.09.15	H17.09.05	H17.09.01	H17.08.25	H17.08.25	H17.08.24	H17.08.23	H17.08.21	
母の父	神高福	金幸	宝政	金幸	金幸	北国7の9	神高福	神高福	
母の祖父	宝政	忠福	神高福	忠福	忠福	神高福	糸藤	第20平茂	
母の祖々父	神高福	第33気高	第20平茂	第2金水	第20平茂	第20平茂	第20平茂	菊照美	
生産地	肝属郡 東串良町	肝属郡 肝付町	鹿屋市 串良町	鹿屋市 串良町	肝属郡 南大隅町	肝属郡 南大隅町	鹿屋市 名貴町	肝属郡 東串良町	
開始時日齢	258	268	272	279	279	280	281	283	275.0
開始時体重	251.0	246.0	264.0	264.0	256.0	250.0	278.0	275.0	260.5
終了時体重	622.0	604.0	642.0	582.0	590.0	654.0	610.0	632.0	617.0
D.G	1.02	0.98	1.04	0.87	0.92	1.11	0.91	0.98	0.98
体高	135.0	133.0	138.4	135.0	132.0	135.4	134.0	133.0	134.5
胸囲	214.0	212.0	215.0	211.0	213.0	215.0	206.0	215.0	212.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,842
	粗飼料 (Kg)								541
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.97
	"								1.52
	"								0.89
	"								6.51
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	598.0	583.0	608.0	564.0	573.0	636.0	578.0	598.0	592.3
枝肉量・温	389.0	372.0	401.0	374.5	374.0	399.5	374.5	392.5	384.6
歩留・温	65.1	63.8	66.0	66.4	65.3	62.8	64.8	65.6	65.0
冷屠体重量	385	367	386	370	368	394	371	387	379
バラの厚さ	7.1	7.9	6.6	7.7	6.8	7.8	7.0	7.4	7.3
皮下脂肪	3.0	2.4	2.6	2.3	3.1	2.7	3.6	3.4	2.9
筋間脂肪	7.2	7.0	6.9	6.6	5.8	6.9	5.6	7.1	6.6
ロース芯面積	61	50	56	45	47	53	47	48	51
推定歩留	74.6	74.5	73.8	73.7	72.7	74.2	72.3	72.7	73.6
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	4	5	4	5	3	4	5	4.4
肉質等級	5	5	5	4	4	4	5	5	4.6
枝肉番号	5458	5459	5460	5461	5462	5463	5464	5465	

検定した種雄牛

安忠茂

(黒原4504)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成14年11月11日 生

産地

志布志市 松山町

血統

忠茂 黒原2625 なつこ 黒原1100576	忠福 黒育 129	さとみ 黒高 125529	安美土井	黒育 48
			第2よしいち	黒高 35156
	平茂勝 黒原 2441	たかこ 黒原 844941	第20平茂	黒育 134
			みどり	黒高 44329
			第20平茂	黒育 134
			ふくみ	黒高 106567
			神高福	黒高 929
			かよこ	黒原 586735

調査牛及び成績

検定期間

平成18年6月7日～平成19年6月6日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	秋男	光忠	茂忠	一郎	福金	4乃2郎	良忠	安金福	
個体識別番号	01126 3247 2	01122 9066 5	01133 7509 5	01134 7458 3	08253 0171 9	01125 6640 1	01133 7521 7	01116 9911 7	
生年月日	H17.09.19	H17.09.18	H17.09.15	H17.09.10	H17.09.05	H17.09.01	H17.08.30	H17.08.27	
母の父	平茂勝	糸藤	平茂勝	安糸福	金幸	平茂勝	金徳	金幸	
母の祖父	忠菊	忠福	金徳	金幸	神高福	神高福	忠福	平茂勝	
母の祖々父	金徳	宝勝	忠福	神高福	宝勝	第20平茂	藤花	神高福	
生産地	志布志市 志布志町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	志布志市 有明町	志布志市 松山町	曾於市 財部町	曾於市 大隅町	
開始時日齢	261	262		270	275	279	281	284	273.1
開始時体重	242.0	296.0		255.0	280.0	261.0	268.0	330.0	276.0
終了時体重	650.0	670.0		632.0	688.0	586.0	608.0	730.0	652.0
D.G	1.12	1.03		1.04	1.12	0.89	0.93	1.10	1.03
体高	137.4	134.4		140.4	141.2	135.4	138.8	142.0	138.5
胸囲	210.0	224.0		218.0	217.0	203.0	221.0	225.0	216.9
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,935
	粗飼料 (Kg)								525
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.80
	"								1.40
	"								0.86
	"								6.32
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	613.0	644.0		620.0	661.0	561.0	586.0	702.0	626.7
枝肉量・温	378.0	417.5		401.0	414.5	337.0	378.5	448.5	396.4
歩留・温	61.7	64.8		64.7	62.7	60.1	64.6	63.9	63.2
冷屠体重量	373	412		396	409	333	374	442	391
バラの厚さ	6.0	7.6		7.5	6.7	5.8	7.1	7.3	6.9
皮下脂肪	1.6	2.0		2.6	2.2	1.8	3.1	2.2	2.2
筋間脂肪	4.5	7.7		6.3	6.0	5.4	6.0	6.5	6.1
ロース芯面積	48	53		47	57	43	51	60	51
推定歩留	73.6	74.4		73.4	74.3	73.1	73.4	74.6	73.8
歩留等級	A	A		A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	3		2+	3-	3	2	4	3.0
肉質等級	5	5		4	5	5	4	5	4.7
枝肉番号	5794	5795		5796	5797	5798	5799	5800	

検定した種雄牛

正次郎 (ET) (黒原 4 5 7 8)
平成15年3月1日生

繋養者 鹿児島県肉用牛改良研究所
産地 志布志市 有明町

血統	紋次郎 黒高938	安美土井 黒育 48	田安土井 黒育 6
		はるみ 黒高 29888	ふくむすめ 黒育 498
	かねこ 黒原958523	富金 黒原 1640	田森土井 黒 7663
		いくこ 黒高 138224	かず 黒 446542
		金水9 黒育 43	とみひら 黒原 187403
		第20平茂 黒育 134	なりこ1 黒育 9393

調査牛及び成績 検定期間 平成18年11月13日～平成19年11月12日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	福次	正次	正次	美和	正次郎	成二	譲二	正太郎	
個体識別番号	01126 5251 7	11171 1616 5	01126 9865 2	08247 3550 8	08247 1987 4	01126 7071 9	08247 2456 4	08247 1936 2	
生年月日	H18.03.15	H18.03.03	H18.03.03	H18.02.27	H18.02.24	H18.02.20	H18.02.18	H18.02.06	
母の父	金幸	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	金幸	平茂勝	
母の祖父	平茂勝	紋次郎	神高福	忠福	安平	神高福	平茂勝	忠福	
母の祖々父	神高福	第20平茂	第20平茂	宝勝	福茂	第20平茂	忠福	菊気高	
生産地	霧島市 福山町	霧島市 横川町	霧島市 牧園町	始良郡 加治木町	始良郡 湧水町	霧島市 福山町	霧島市 牧園町	始良郡 湧水町	
開始時日齢	243	255	255	259	262	266	268	280	261.0
開始時体重	265.0	247.0	254.0	270.0	291.0	277.0	279.0	291.0	271.8
終了時体重	658.0	604.0	592.0	690.0	622.0	642.0	578.0	620.0	625.8
D.G	1.08	0.98	0.93	1.15	0.91	1.00	0.82	0.90	0.97
体高	142.4	134.0	135.0	139.0	139.4	138.4	139.0	138.4	138.2
胸囲	211.0	209.0	210.0	220.0	206.0	210.0	207.0	208.0	210.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,820
	粗飼料 (Kg)								487
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.97
	"								1.38
	"								0.88
	"								6.43
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	634.0	586.0	573.0	663.0	600.0	613.0	556.0	601.0	603.3
枝肉量・温	405.5	385.0	372.0	430.0	381.5	396.5	361.0	385.0	389.6
歩留・温	64.0	65.7	64.9	64.9	63.6	64.7	64.9	64.1	64.6
冷屠体重量	396	381	368	426	378	391	357	382	385
バラの厚さ	6.6	7.6	7.3	7.1	6.1	6.7	6.4	6.8	6.8
皮下脂肪	2.5	2.2	2.0	2.7	1.7	2.1	2.5	2.6	2.3
筋間脂肪	5.0	6.4	6.1	6.1	4.7	5.1	6.0	5.7	5.6
ロース芯面積	40	43	49	53	47	47	39	41	45
推定歩留	71.9	73.3	74.2	73.3	73.3	73.2	72.0	72.2	72.9
歩留等級	B	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3-	3	4	3	3	2+	2	2+	2.8
肉質等級	4	5	5	5	5	4	4	4	4.5
枝肉番号	4894	4895	4896	4897	4898	4899	4900	4901	

検定した種雄牛

忠茂丸

(黒原4573)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成15年5月8日生

産地

曾於市 財部町

血統	忠茂 黒原 2625	忠福	安美土井	黒育 48
		黒育 129	第2よしいち	黒高 35156
	ゆりあ2 黒原 1022718	さとみ	第20平茂	黒育 134
		黒高 125529	みどり	黒高 44329
		平茂勝 黒原 2441	第20平茂	黒育 134
		たまみ 黒原 819646	ふくみ	黒高 106567
			第5隼福	黒原 2016
			ひろみ	黒原 628583

調査牛及び成績

検定期間

平成18年12月4日～平成19年12月3日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	福太郎	茂丸	満茂丸	太陽	勇太	勝丸	忠広	金夫	
個体識別番号	01133 8885 9	08254 0953 8	08253 1622 5	08254 0689 6	08258 0003 8	01124 9046 1	08253 1646 1	08253 1331 6	
生年月日	H18.03.20	H18.03.11	H18.03.08	H18.03.07	H18.03.07	H18.03.02	H18.03.01	H18.02.19	
母の父	神高福	谷秋	金徳	金幸	金徳	北国7の3	金徳	金徳	
母の祖父	第20平茂	第20平茂	第15気高	神高福	忠福	第20平茂	忠福	神高福	
母の祖々父	薩摩	第2金水	東栄	第20平茂	豊川	第20気高	金水9	第15気高	
生産地	曾於市 財部町	曾於郡 大崎町	志布志市 有明町	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	鹿屋市 輝北町	志布志市 有明町	志布志市 有明町	
開始時日齢	259	268	271	272	272	277	278	288	273.1
開始時体重	238.0	301.0	253.0	238.0	304.0	249.0	324.0	305.0	276.5
終了時体重	584.0	674.0	588.0	586.0	698.0	608.0	634.0	698.0	633.8
D.G	0.95	1.02	0.92	0.96	1.08	0.99	0.85	1.08	0.98
体高	130.0	137.0	131.0	133.4	141.2	130.4	137.0	136.4	134.6
胸囲	212.0	222.0	217.0	216.0	222.0	219.0	214.0	219.0	217.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,827
	粗飼料 (Kg)								530
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.91
	"								1.48
	"								0.88
	"								6.45
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	566.0	647.0	562.0	563.0	671.0	586.0	623.0	671.0	611.1
枝肉量・温	369.5	408.5	367.0	359.0	435.5	373.0	401.0	436.5	393.8
歩留・温	65.3	63.1	65.3	63.8	64.9	63.7	64.4	65.1	64.5
冷屠体重量	366	405	363	357	431	370	399	432	390
バラの厚さ	6.3	7.4	6.8	6.0	7.5	8.0	7.5	7.6	7.1
皮下脂肪	1.9	2.3	2.1	2.2	2.1	3.4	3.2	1.9	2.4
筋間脂肪	6.3	5.8	7.7	5.7	5.4	7.0	6.2	5.5	6.2
ロース芯面積	47	56	42	49	57	52	50	53	51
推定歩留	73.5	74.5	73.0	73.3	74.5	73.9	73.0	72.9	73.6
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	5	4	3	5	4	3-	4	4.0
肉質等級	5	5	5	4	5	5	4	5	4.8
枝肉番号	6538	6539	6540	6541	6542	6543	6544	6545	

検定した種雄牛

佐多気高(ET) (黒原4653)
平成15年11月23日生

繋養者
産地

鹿児島県肉用牛改良研究所
肝属郡 南大隅町

血統	宝政 黒原1921	宝勝 黒育175	第8気高 黒高 388
		しま3 黒高 50578	ほりぞえ1 黒育 1522
	ふゆみ 黒1892414	第20平茂 黒育 134	宝徳 黒育 128
		ふゆこ 黒原 556102	第3あけみ 黒高 25430
			気高 黒育 9
			第13ひらしげ 黒高 16819
			第20気高 黒育 78
			ゆきこ 黒原 148476

調査牛及び成績 検定期間 平成18年12月6日~平成19年12月5日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	宗徳	勝男8	気高栄	希望	実験341	秋美8	佐多幸	玉三郎	
個体識別番号	01136 2388 2	01133 1226 7	12156 1001 5	12191 1691 9	01127 8010 4	01133 1225 0	01127 8863 6	01127 8826 1	
生年月日	H18.04.16	H18.04.13	H18.04.13	H18.04.12	H18.04.09	H18.04.09	H18.04.05	H18.03.25	
母の父	金幸	平茂勝	忠福	美華忠	安糸福	平茂勝	神高福	平茂勝	
母の祖父	忠福	忠福	神高福	神高福	平茂勝	神高福	第20平茂	神高福	
母の祖父々	第20平茂	金水9	第20平茂	第2糸広	安平	幸平	第2金水	第20平茂	
生産地	川辺郡 知覧町	鹿児島市	いちき 串木野市	川辺郡 知覧町	出水郡 長島町	鹿児島市	出水市 高尾野町	出水市 高尾野町	
開始時日齢	234	237	237	238	241	241	245	256	241.1
開始時体重	250.0	212.0	247.0	228.0	248.0	274.0	249.0	317.0	253.1
終了時体重	616.0	578.0	594.0	572.0	714.0	662.0	544.0	696.0	622.0
D.G	1.01	1.01	0.95	0.95	1.28	1.07	0.81	1.04	1.01
体高	132.2	131.6	135.2	136.8	141.2	134.4	134.6	138.4	135.6
胸囲	208.0	217.0	211.0	206.0	221.0	220.0	206.0	221.0	213.8
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,709
	粗飼料 (Kg)								558
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.34
	"								1.51
	"								0.82
	"								6.06
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	590.0	559.0	579.0	550.0	694.0	645.0	531.0	670.0	602.3
枝肉量・温	381.5	363.0	370.0	351.0	446.0	418.5	335.5	436.5	387.8
歩留・温	64.7	64.9	63.9	63.8	64.3	64.9	63.2	65.1	64.4
冷屠体重量	378	359	366	347	442	415	332	433	384
バラの厚さ	6.7	7.7	6.6	6.4	7.3	7.0	6.2	8.6	7.1
皮下脂肪	3.3	2.9	2.6	1.8	2.0	2.7	2.1	3.2	2.6
筋間脂肪	5.7	6.1	6.3	4.6	6.1	5.6	5.7	6.9	5.9
ロース芯面積	45	42	47	63	73	53	47	45	52
推定歩留	72.1	72.9	73.0	75.9	76.4	73.4	73.6	72.7	73.8
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	3-	2+	3	5	3	3	4	3.3
肉質等級	4	5	4	5	5	5	5	5	4.8
枝肉番号	6655	6656	6657	6658	6659	6660	6661	6662	

検定した種雄牛

豊乃国

(黒13938)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成15年12月22日生

産地

鹿屋市 下祓川町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成18年12月11日～平成19年12月10日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	豊福	島人	新平	秀豊	豊	松豊	永乃5	国男	
個体識別番号	01128 9547 1	08250 1828 0	08250 1921 8	08293 2370 0	08250 0626 3	08293 2369 4	08250 1866 2	01123 3358 4	
生年月日	H18.04.13	H18.04.10	H18.04.10	H18.04.09	H18.04.07	H18.04.07	H18.04.02	H18.03.20	
母の父	神高福	平茂勝	金澄	平茂勝	忠福	神高福	金幸	第5平茂	
母の祖父	北国7の3	忠福	忠福	安谷福	第20平茂	第5平茂	平茂勝	田安福	
母の祖父父	第20平茂	第20気高	金豊	金一	金豊	忠福	神高福	薩摩	
生産地	熊毛郡 中種子町	西之表市	西之表市	熊毛郡 中種子町	西之表市	熊毛郡 中種子町	西之表市	熊毛郡 南種子町	
開始時日齢	242	245	245	246	248	248	253	266	249.7
開始時体重	261.0	216.0	273.0	202.0	271.0	230.0	267.0	271.0	245.4
終了時体重	640.0	602.0		582.0	654.0	634.0	708.0	638.0	636.9
D.G	1.04	1.06		1.04	1.05	1.11	1.21	1.01	1.07
体高	136.0	137.0		137.0	133.4	134.2	138.0	133.4	135.6
胸囲	209.0	212.0		205.0	218.0	218.0	221.0	204.0	212.4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,944
	粗飼料 (Kg)								506
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.52
	"								1.29
	"								0.83
	"								6.06
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	611.0	592.0		554.0	634.0	592.0	668.0	604.0	607.9
枝肉量・温	398.0	385.5		352.5	407.0	392.5	430.0	381.0	392.4
歩留・温	65.1	65.1		63.6	64.2	66.3	64.4	63.1	64.5
冷屠体重量	394	382		349	403	389	427	377	389
バラの厚さ	7.5	7.2		6.0	7.9	6.8	7.6	6.1	7.0
皮下脂肪	2.1	2.1		1.7	2.5	3.0	2.0	1.8	2.2
筋間脂肪	6.9	6.1		5.3	7.0	6.7	6.7	5.3	6.3
ロース芯面積	50	57		51	57	44	48	49	51
推定歩留	74.1	75.0		74.1	74.9	72.1	73.6	73.5	73.9
歩留等級	A	A		A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	5		3-	5	2+	5	3-	3.7
肉質等級	5	5		4	5	4	5	4	4.6
枝肉番号	7087	7088		7089	7090	7091	7092	7093	