

検定した種雄牛

福美高

(黒原 4 6 7 8)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年1月25日 生

産地

鹿屋市 吾平町

血統	福美勝 黒原 3049	神高福 黒高 929	忠福 黒育 129
		ひでみ 1 黒原 520967	めぐみ 黒高 69294
	こだま 黒原 1014194	神高福 黒高 929	宝徳 黒育 128
		第9ひかり 2 黒原 532227	ひでみ 黒原 427121
		忠福 黒育 129	めぐみ 黒高 69294
		第20平茂 黒育 134	第9ひかり 黒高105194

調査牛及び成績 検定期間 平成19年4月23日～平成20年4月21日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	東郷217	福美	東郷214	耕109之5	誠25之6	大祐	福助	北海	
個体識別番号	12406 6803 6	02007 2066 1	12402 6799 4	03932 0540 2	03932 3429 7	01118 9490 1	03932 3466 2	02007 1635 0	
生年月日	H18.08.19	H18.08.17	H18.08.15	H18.08.14	H18.08.10	H18.08.05	H18.07.26	H18.07.14	
母の父	神高福	平茂勝	第2平茂勝	第5隼福	平茂勝	平茂勝	忠福	平茂勝	
母の祖父	第20気高	神高福	忠福	第20平茂	忠福	神高福	第20平茂	福栄	
母の祖々父	豊川	第20平茂	第20平茂	安谷福	吉1	忠福	金水9	賢深	
生産地	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩川内市	薩摩郡 さつま町	薩摩川内市	薩摩川内市	
開始時日齢	247	249	251	252	256	261	271	283	258.8
開始時体重	234.0	289.0	248.0	247.0	297.0	294.0	248.0	325.0	272.8
終了時体重	622.0	672.0	640.0	596.0	716.0	656.0	572.0	710.0	648.0
D.G	1.07	1.05	1.08	0.96	1.15	0.99	0.89	1.06	1.03
体高	139.0	140.0	142.0	137.0	146.0	142.0	135.0	136.2	139.7
胸囲	206.0	217.0	214.0	206.0	221.0	214.0	207.0	213.0	212.3
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,776 622
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " D C P (Kg) " T D N (Kg)								7.40 1.66 0.84 6.17
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	606.0	649.0	609.0	563.0	687.0	644.0	557.0	687.0	625.3
枝肉量・温	383.0	412.5	385.0	351.5	451.5	412.0	343.6	437.0	397.0
歩留・温	63.2	63.6	63.2	62.4	65.7	64.0	61.7	63.6	63.4
冷屠体重量	381	409	382	349	449	409	342	433	394
バラの厚さ	6.7	7.1	6.4	6.2	7.8	6.8	6.2	6.8	6.8
皮下脂肪	2.7	2.7	2.6	2.1	2.8	2.6	2.6	2.8	2.6
筋間脂肪	6.5	6.1	6.3	5.7	7.7	5.9	6.1	5.3	6.2
ロース芯面積	39	53	44	47	54	50	39	52	47
推定歩留	71.8	73.5	72.3	73.4	73.5	73.0	72.0	72.8	72.8
歩留等級	B	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	5	3	2+	3	2-	3-	4	3.1
肉質等級	4	5	4	4	5	3	4	5	4.3
枝肉番号	4693	4694	4695	4696	4697	4698	4699	4700	

検定した種雄牛

金栄照

(黒原4608)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成15年9月2日生

産地

肝属郡 東串良町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成19年4月25日～平成20年4月23日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	連270	義蔵	初節	泰栄	金照勝	由樹	鉄拳	金栄	
個体識別番号	01132 6126 8	01126 1097 5	01122 5303 5	12087 3427 8	01119 3356 3	02006 7219 9	12088 1376 8	01122 3760 8	
生年月日	H18.08.21	H18.08.18	H18.08.09	H18.07.29	H18.07.26	H18.07.22	H18.07.18	H18.07.18	
母の父	第20平茂	平茂勝	平茂勝	平茂勝	神高福	北国7の3	神高福	平茂勝	
母の祖父	隆茂福	忠福	谷福	神高福	第20気高	忠福	第20平茂	神高福	
母の祖々父	忠福	金豊	第20平茂	第20平茂	白金9	第20平茂	田安福	第20平茂	
生産地	肝属郡 肝付町	肝属郡 肝付町	肝属郡 南大隅町	肝属郡 南大隅町	肝属郡 錦江町	肝属郡 東串良町	垂水市	肝属郡 南大隅町	
開始時日齢	247	250	259	270	273	277	281	281	267.3
開始時体重	250.0	266.0	256.0	314.0	268.0	265.0	291.0	273.0	272.9
終了時体重	692.0	708.0	658.0	758.0	670.0	626.0	666.0	652.0	678.8
D.G	1.21	1.21	1.10	1.22	1.10	0.99	1.03	1.04	1.12
体高	135.4	143.0	136.8	140.6	136.0	136.0	135.0	133.0	137.0
胸囲	227.0	223.0	220.0	232.0	218.0	216.0	220.0	217.0	221.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,129
	粗飼料 (Kg)								477
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.71
	"								1.18
	"								0.84
	"								6.13
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	663.0	681.0	630.0	726.0	643.0	594.0	638.0	617.0	649.0
枝肉量・温	420.5	433.0	404.5	466.5	414.5	363.5	409.5	388.0	412.5
歩留・温	63.4	63.6	64.2	64.3	64.5	61.2	64.2	62.9	63.5
冷屠体重量	415	429	400	463	411	360	406	384	408
バラの厚さ	7.9	6.9	6.4	7.9	7.4	6.0	7.2	6.4	7.0
皮下脂肪	2.5	2.8	2.9	4.0	1.9	2.9	2.7	2.7	2.8
筋間脂肪	6.3	6.4	5.7	7.5	6.3	6.4	6.9	6.7	6.5
ロース芯面積	46	42	44	46	45	46	46	49	46
推定歩留	73.3	71.6	71.8	71.3	73.4	72.3	72.7	72.8	72.4
歩留等級	A	B	B	B	A	A	A	A	A
脂肪交雑	5	3-	3	3-	3	3-	2+	3	3.0
肉質等級	5	4	5	5	4	4	4	5	4.5
枝肉番号	4807	4808	4809	4810	4811	4812	4813	4814	

検定した種雄牛

喜風福 (ET) (黒原 4 5 7 4)
平成15年5月27日 生

繋養者
産 地

鹿児島県肉用牛改良研究所
大島郡 喜界町

血 統	金 幸 黒原2865	金 徳 黒高 939	金水 9 黒育 43	とみひら 黒原 187403
		かよこ 黒高 130038	神高福 黒高 929	かおよ 5 黒高 115466
	みちこ 黒原885314	神高福 黒高 929	忠福 黒育 129	めぐみ 黒高 69294
		かねこ 黒原 491968	第 1 5 金水 黒育 146	第10いけやま2 黒育 11327

調査牛及び成績 検定期間 平成19年5月30日～平成20年5月28日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	喜 宝	喜 風	幸 夫	健 太	青 雲	喜 福	大 成	松姫乃 1	
個体識別番号	02039 4039 4	02042 4268 8	01121 7986 1	08294 3877 0	01121 7999 1	02040 8303 8	08294 0044 9	01121 7993 9	
生年月日	H18. 09. 22	H18. 09. 06	H18. 09. 05	H18. 09. 03	H18. 09. 01	H18. 08. 31	H18. 08. 25	H18. 08. 15	
母の父	神高福	神高福	第5隼福	神徳福	平茂勝	平茂勝	平茂勝	平茂勝	
母の祖父	第20平茂	忠 福	神高福	宝 政	神高福	紋次郎	神高福	紋次郎	
母の祖々父	第20気高	宝 勝	第20平茂	菊照美	第20平茂	城芳14	菊照美	奥 高	
生 産 地	大島郡 知名町	大島郡 喜界町	大島郡 天城町	大島郡 伊仙町	大島郡 天城町	大島郡 与論町	大島郡 徳之島町	大島郡 天城町	
開始時日齢	250	266	267	269	271	272	278	288	270. 1
開始時体重	229. 0	272. 0	266. 0	285. 0	303. 0	289. 0	271. 0	306. 0	277. 6
終了時体重	552. 0	596. 0	619. 0	647. 0	681. 0	645. 0	600. 0	734. 0	634. 3
D . G	0. 89	0. 89	0. 97	0. 99	1. 04	0. 98	0. 90	1. 18	0. 98
体 高	130. 8	132. 0	136. 0	140. 6	139. 4	137. 2	133. 0	139. 0	136. 0
胸 囲	205. 0	212. 0	210. 0	214. 0	222. 0	216. 0	216. 0	228. 0	215. 4
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2, 747
	粗飼料 (Kg)								614
飼料要求率	1Kg増体に要した								7. 70
	"								1. 72
	"								0. 87
	"								6. 42
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	531. 0	574. 0	587. 0	616. 0	653. 0	619. 0	580. 0	703. 0	607. 9
枝肉量・温	342. 0	366. 0	377. 0	400. 5	424. 0	401. 0	374. 0	454. 5	392. 4
歩留・温	64. 4	63. 8	64. 2	65. 0	64. 9	64. 8	64. 5	64. 7	64. 5
冷屠体重量	338	361	373	396	419	396	370	448	388
バラの厚さ	6. 4	6. 7	6. 8	6. 4	7. 3	7. 2	7. 3	8. 1	7. 0
皮下脂肪	2. 0	2. 8	2. 4	2. 8	2. 5	2. 0	2. 0	2. 3	2. 4
筋間脂肪	6. 3	6. 9	6. 8	6. 8	7. 2	6. 0	6. 9	7. 4	6. 8
ロース芯面積	46	49	44	48	55	46	45	51	48
推定歩留	73. 7	73. 2	72. 9	72. 5	74. 0	73. 5	73. 7	73. 8	73. 4
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	4	3	3-	3	2+	3	3	3. 0
肉質等級	5	5	5	4	4	4	5	5	4. 6
枝肉番号	6295	6296	6297	6298	6299	6300	6301	6302	

検定した種雄牛

土龍波 (ET) (黒原 4 6 7 5)
平成16年1月16日 生

繋養者
産 地

鹿児島県肉用牛改良研究所
大口市

血 統	安福 1 6 5 の 9 黒原1683	安福 黒育 180	安谷土井 黒育 85
		しげふじ13の7 黒高 67760	ちずる 黒育 7592
	ひなぎく 8 黒原1034999	菊谷 黒育 197	茂富士 黒育 93
		すなお 黒原 661236	おく 黒 1058967
			安谷土井 黒育 85
			きくしげ 黒 1144661
			第20平茂 黒育 134
			第3ひらの 黒原 117770

調査牛及び成績 検定期間 平成19年6月6日～平成20年6月4日

区 分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	金 太	太 郎 則	福之国	富 夫	秋 斗	平茂波	大 次 郎	隼 斗	
個体識別番号	02051 3471 5	03936 3087 7	02051 3045 8	02051 3210 0	02051 3122 6	02051 3076 2	08299 1276 8	03936 2738 9	
生年月日	H18.09.18	H18.09.17	H18.09.14	H18.09.02	H18.09.01	H18.09.01	H18.08.29	H18.08.25	
母の父	金 徳	平茂勝	金 幸	金 徳	神高福	平茂勝	平茂勝	金 徳	
母の祖父	宝 勝	神高福	神高福	忠 福	第20平茂	忠嶋隆	神高福	忠 福	
母の祖々父	豊 和	宝 勝	若 藤	田安森3	忠 福	平茂勝	第20平茂	田安森3	
生 産 地	曾於郡 大崎町	曾於市 末吉町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	曾於市 末吉町	
開始時日齢	261	262	265	277	278	278	281	285	273.4
開始時体重	262.0	306.0	274.0	302.0	306.0	318.0	315.0	305.0	298.5
終了時体重	604.0	676.0	648.0	620.0	654.0	708.0	690.0	630.0	653.8
D . G	0.94	1.02	1.03	0.87	0.96	1.07	1.03	0.89	0.98
体 高	141.0	141.0	137.0	141.0	139.0	143.0	139.0	139.0	140.0
胸 囲	211.0	223.0	214.0	213.0	215.0	225.0	226.0	218.0	218.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,868 520
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.07
	"								1.46
	"								0.89
	"								6.55
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	584.0	657.0	631.0	601.0	640.0	685.0	673.0	613.0	635.5
枝肉量・温	374.0	433.5	405.5	401.5	414.5	441.5	443.0	391.0	413.1
歩留・温	64.0	66.0	64.3	66.8	64.8	64.5	65.8	63.8	65.0
冷屠体重量	369	427	402	396	410	436	438	386	408
バラの厚さ	6.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.2	7.7	6.8	7.1
皮下脂肪	2.5	3.1	2.7	2.8	2.9	3.1	2.9	2.2	2.8
筋間脂肪	6.4	7.7	7.6	5.9	6.9	7.1	7.5	6.9	7.0
ロース芯面積	41	52	49	50	55	56	56	46	51
推定歩留	72.4	72.8	72.9	73.0	73.2	73.9	73.8	73.2	73.2
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	5	3	4	3-	5	4	4	4.0
肉質等級	5	5	4	5	4	5	5	5	4.8
枝肉番号	6555	6556	6557	6558	6559	6560	6561	6562	

検定した種雄牛

金政治

(黒原4676)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年3月7日生

産地

霧島市 溝辺町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成19年11月28日～平成20年11月26日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	澄金晴	隼金	金隼福	金政	金福	松坂	金政	安治郎	
個体識別番号	02043 8811 9	02043 9085 3	02439 7248 5	02043 7097 8	02072 3045 3	02072 3000 2	02043 7062 6	02072 2994 5	
生年月日	H19.03.09	H19.03.03	H19.03.03	H19.03.02	H19.03.02	H19.02.25	H19.02.20	H19.02.15	
母の父	平茂勝	第5隼福	第5隼福	金幸	神徳福	平茂勝	神高福	安糸福	
母の祖父	忠福	平茂勝	糸藤	忠福	平茂勝	北国7の3	宝勝	宝政	
母の祖父々	第20平茂	忠福	忠福	第20平茂	忠福	忠福	豊川	忠福	
生産地	始良郡 始良町	始良郡 加治木町	霧島市 溝辺町	始良郡 湧水町	霧島市 牧園町	霧島市 牧園町	始良郡 湧水町	霧島市 横川町	
開始時日齢	264	270	270	271	271	276	281	286	273.6
開始時体重	297.0	268.0	258.0	319.0	263.0	318.0	329.0	337.0	298.6
終了時体重	650.0	582.0	552.0	658.0	626.0	774.0	682.0	718.0	655.3
D . G	0.97	0.86	0.81	0.93	1.00	1.25	0.97	1.05	0.98
体 高	139.5	138.5	129.0	136.0	136.5	144.0	137.0	143.0	137.9
胸 囲	219.0	211.0	208.0	216.0	210.0	230.4	216.0	230.4	217.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								2,929
	粗飼料 (Kg)								568
飼料要求率	1Kg増体に要した								8.21
	"								1.59
	"								0.92
	"								6.72
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	627.0	561.0	531.0	636.0	613.0	756.0	661.0	697.0	635.3
枝肉量・温	415.0	373.0	344.5	401.0	374.0	484.5	413.0	451.0	407.0
歩留・温	66.2	66.5	64.9	63.1	61.0	64.1	62.5	64.7	64.1
冷屠体重量	412	371	342	398	371	481	410	447	404
バラの厚さ	7.7	7.9	6.7	6.9	6.5	8.2	6.1	8.6	7.3
皮下脂肪	2.7	3.3	1.9	2.6	1.9	2.9	2.0	3.1	2.6
筋間脂肪	7.2	6.0	6.4	6.2	5.8	6.5	5.2	6.7	6.3
ロース芯面積	53	40	54	46	50	58	53	49	50
推定歩留	73.8	72.3	74.9	72.7	73.9	73.9	73.4	73.2	73.5
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	4	3-	2+	3	4	3-	3	3.2
肉質等級	5	5	5	4	5	5	5	5	4.9
枝肉番号	7120	7121	7122	7123	7124	7125	7126	7127	

検定した種雄牛

財金茂

(黒原4788)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年9月14日生

産地

曾於市 財部町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成19年12月5日～平成20年12月3日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	財宝	大吉	金茂	金正	財福	金茂	財金	伊勢次	
個体識別番号	02042 9730 5	02042 9786 2	02041 9268 6	02049 5084 2	02051 4981 8	02042 9763 3	02041 9497 0	08255 0910 8	
生年月日	H19.03.13	H19.03.09	H19.03.05	H19.03.05	H19.03.05	H19.03.01	H19.02.21	H19.02.20	
母の父	平茂勝	平茂勝	金徳	平茂勝	福美勝	第5隼福	神高福	神高福	
母の祖父	第2神高	忠福	忠福	忠福	金徳	金徳	宝勝	金徳	
母の祖々父	忠福	第20平茂	宝勝	宝徳	宝勝	宝勝	第15気高	忠福	
生産地	曾於市 財部町	曾於市 財部町	志布志市 松山町	志布志市 有明町	曾於郡 大崎町	曾於市 財部町	志布志市 松山町	曾於市 大隅町	
開始時日齢	267	271	275	275	275	279	287	288	277.1
開始時体重	312.0	274.0	353.0	330.0	286.0	296.0	286.0	291.0	303.5
終了時体重	706.0	592.0	708.0	704.0	622.0	624.0	658.0	586.0	650.0
D.G	1.08	0.87	0.98	1.03	0.92	0.90	1.02	0.81	0.95
体高	139.0	132.0	140.0	139.0	138.0	139.0	137.0	139.0	137.9
胸囲	220.0	222.0	218.0	219.0	215.0	213.0	220.0	209.0	217.0
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,865 496
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " D C P (Kg) " T D N (Kg)								8.27 1.43 0.91 6.67
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	714.0	603.0	710.0	712.0	627.0	630.0	669.0	607.0	659.0
枝肉量・温	450.0	387.0	447.5	446.5	408.5	396.5	422.5	362.5	415.1
歩留・温	63.0	64.2	63.0	62.7	65.2	62.9	63.2	59.7	63.0
冷屠体重量	446	384	444	443	405	393	419	359	412
バラの厚さ	7.5	8.0	7.8	7.4	7.5	7.0	7.6	6.6	7.4
皮下脂肪	1.8	3.6	2.7	2.7	2.0	1.8	2.5	1.8	2.4
筋間脂肪	7.2	6.5	6.4	5.1	6.7	6.3	7.6	6.0	6.5
ロース芯面積	55	49	58	56	46	52	53	55	53
推定歩留	74.4	73.1	74.2	73.7	73.5	74.3	73.9	74.9	74.0
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	4	5	5	4	3	5	4	4	4.3
肉質等級	5	5	5	5	5	5	5	5	5.0
枝肉番号	7883	7884	7885	7886	7887	7888	7889	7890	

検定した種雄牛

純金平

(黒原4787)

繋養者

鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年10月22日生

産地

いちき串木野市

血統	金 幸 黒原 2865	金 徳 黒高 939	かよこ 黒高 130038	金水9	黒育 43
				とみひら	黒原 187403
	第2なかひめ 黒原 1059780	平茂勝 黒原 2441	よしこ 黒原 788341	神高福	黒高 929
				かおよ5	黒高 115466
			第20平茂	黒育 134	
			ふくみ	黒高 106567	
			忠福	黒育 129	
			ふくよし	黒原 439666	

調査牛及び成績 検定期間 平成19年12月17日～平成20年12月15日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名 号	勝 美	純 金	純 金	純金勝	勝 幸	秋 春	純 試 正	実 験 445	
個体識別番号	08292 2846 3	08292 2860 9	02050 1711 7	02442 3942 6	08292 1579 1	05254 1387 3	05254 1748 2	01127 8217 7	
生年月日	H19.04.11	H19.04.07	H19.04.05	H19.04.02	H19.03.29	H19.03.19	H19.03.19	H19.03.15	
母の父	平茂勝	平茂勝	神高福	平茂勝	平茂勝	神高福	宝 政	神高福	
母の祖父	神高福	神高福	第20平茂	忠 福	神高福	第20平茂	神高福	糸 晴	
母の祖々父	第20平茂	第20平茂	田安福	第20気高	隼 信	田安福	第20平茂	宝 勝	
生産地	出水郡 長島町	出水郡 長島町	いちき 串木野市	出水郡 長島町	出水市 高尾野町	指宿市 開闢十町	指宿郡 額娃町	出水郡 長島町	
開始時日齢	250	254	256	259	263	273	273	277	263.1
開始時体重	292.0	220.0	287.0	279.0	276.0	305.0	329.0	286.0	284.3
終了時体重	674.0	612.0	664.0	680.0	644.0	696.0	746.0	708.0	678.0
D . G	1.05	1.08	1.04	1.10	1.01	1.07	1.15	1.16	1.08
体 高	138.0	135.0	138.0	141.4	139.0	140.0	141.0	137.0	138.7
胸 囲	223.0	210.0	224.0	221.0	219.0	225.0	229.0	230.0	222.6
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg)								3,109
	粗飼料 (Kg)								411
飼料要求率	1Kg増体に要した								7.90
	"								1.04
	"								0.85
	"								6.20
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	669.0	591.0	654.0	657.0	624.0	683.0	728.0	693.0	662.4
枝肉量・温	427.0	378.0	434.0	432.5	419.0	455.5	480.0	448.0	434.3
歩留・温	63.8	64.0	66.4	65.8	67.1	66.7	65.9	64.6	65.5
冷屠体重量	424	375	431	429	415	451	476	444	431
バラの厚さ	7.7	6.9	8.0	8.3	8.6	8.3	8.1	8.3	8.0
皮下脂肪	2.5	2.7	2.5	2.0	2.6	2.8	3.1	2.9	2.6
筋間脂肪	6.5	6.3	7.3	6.2	7.3	6.5	8.6	7.2	7.0
ロース芯面積	48	39	40	53	45	48	52	47	47
推定歩留	73.2	72.0	72.3	74.7	73.5	73.0	72.9	72.9	73.1
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	3	3-	2+	5	5	3	5	4	3.8
肉質等級	5	4	4	5	5	5	5	5	4.8
枝肉番号	708	709	710	711	712	713	714	715	

検定した種雄牛

勝寅秀

(黒原 4713)

繋養者


鹿児島県肉用牛改良研究所

平成16年3月28日 生

産地

熊本郡 中種子町

血統



調査牛及び成績

検定期間

平成19年12月19日～平成20年12月17日

区分	1	2	3	4	5	6	7	8	平均
名号	島次郎	勝寅	寅雄	勝秀	寅男	勝春	秀雄	勝丸	
個体識別番号	08293 1610 8	02044 4201 9	02043 3301 0	02043 3519 9	02043 3536 6	02043 3639 4	02043 4153 4	08293 1161 5	
生年月日	H19. 04. 13	H19. 04. 10	H19. 04. 05	H19. 04. 05	H19. 03. 31	H19. 03. 31	H19. 03. 30	H19. 03. 10	
母の父	神高福	神高福	平茂勝	金幸	金幸	金幸	安糸福	神高福	
母の祖父	北国7の3	宝勝	神高福	平茂勝	忠福	安谷福	平茂勝	第20平茂	
母の祖々父	忠福	但馬福	第20平茂	北国7の3	第20平茂	第20平茂	忠福	金豊	
生産地	熊本郡 中種子町	熊本郡 南種子町	西之表市	西之表市	西之表市	西之表市	西之表市	熊本郡 中種子町	
開始時日齢	250	253	258	258	263	263	264	284	261.6
開始時体重	247.0	276.0	261.0	271.0	332.0	254.0	245.0	358.0	280.5
終了時体重	694.0	638.0	740.0	630.0	694.0	650.0	556.0	730.0	666.5
D.G	1.23	0.99	1.32	0.99	0.99	1.09	0.85	1.02	1.06
体高	140.0	136.0	141.0	140.0	143.0	136.0	134.0	137.4	138.4
胸囲	216.0	213.0	227.0	211.0	219.0	215.0	206.0	222.0	216.1
1頭当たりの 飼料摂取量	濃厚飼料 (Kg) 粗飼料 (Kg)								2,901 660
飼料要求率	1Kg増体に要した " 濃厚飼料 (Kg) " 粗飼料 (Kg) " D C P (Kg) " T D N (Kg)								7.52 1.71 0.85 6.28
NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	
屠殺前体重	671.0	618.0	720.0	607.0	678.0	630.0	539.0	708.0	646.4
枝肉量・温	416.5	396.0	452.0	380.0	429.5	396.0	339.5	463.0	409.1
歩留・温	62.1	64.1	62.8	62.6	63.3	62.9	63.0	65.4	63.3
冷屠体重量	412	393	448	377	425	392	337	460	406
バラの厚さ	6.7	6.9	7.5	6.3	6.9	6.4	5.7	6.8	6.7
皮下脂肪	2.2	2.7	3.1	2.8	3.1	2.4	2.3	2.7	2.7
筋間脂肪	6.2	6.3	6.6	6.2	5.5	6.6	5.7	7.2	6.3
ロース芯面積	46	50	43	49	51	56	43	59	50
推定歩留	72.8	73.2	71.7	72.8	72.6	73.9	72.5	73.5	72.9
歩留等級	A	A	B	A	A	A	A	A	A
脂肪交雑	2+	2+	3-	3-	3	3	3	2+	2.7
肉質等級	3	3	5	4	4	5	5	4	4.1
枝肉番号	886	887	888	889	890	891	892	893	