


[平成27年2月作成]

- 脂肪交雑の育種価(H26.12分析)で県4位にランクイン！
- 脂肪交雑の形状，肉テリ，モモへのサシ抜けが魅力
- 母は「なかはら」系統，「気高系」や「但馬系」母牛への交配が最適

益 華 福



登録番号 黒原5353 (85.6)
 生年月日 H21.6.12
 産地 鹿屋市
 生産者 福山 牛夫 氏
 体高 154.0 cm
 近交係数 10.60 %
 美点 発育 体積 体伸
 均称 中軀 前軀
 皮膚 乳徴
 系統の特徴 「なかはら」系統



【交配対象】
安福久，安糸福，勝忠平
百合茂，華春福，隆之国
 などが父の雌牛

始祖牛	金水9	宝春	第20平茂	宝勝	忠福	神高福
遺伝子保有確率(%)	31.2	4.5	48.7	12.1	23.9	34.7

	終了時体重 (kg)	枝肉重量 (kg)	DG (kg)	ロース芯面積 (cm ²)	バラの厚さ (cm)	皮下脂肪 (cm)	歩留基準値 (%)	筋間脂肪 (cm)	BMSNo (サン)
間接後代検定成績(H26.3)	786.9	482.7	1.02	60.0	8.4	2.8	74.2	7.9	8.1
育種価(H26.12分析)	—	B	—	H	C	H	H	—	H




第2回JAグループ
 肥育牛センター
 枝肉研修会出品牛
BMS No12

母の父：神徳福 母の祖父：忠福
 性別：去勢 枝肉重量：521.7 kg
 ロース芯：65 cm² バラ厚：8.6 cm
 皮下脂肪：1.4 cm BMSNo：12
 格付：A5

サーロインへのキメ細かいサシ抜け

モモへのサシ抜けも良好



※枝肉横断面ばかりでなく、サーロイン、モモへのサシ抜けがみられました

【現場検定（中間）成績】

平成27年1月現在

No.	性別	祖父	祖祖父	生年月日	格付年月日	出荷月齢	枝肉重量	等級		ロ-入芯	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	BMS No	BCS No
								歩留	肉質						
1	去勢	神徳福	忠福	H24.8.17	H26.12.22	28.1	521.7	A	5	65	8.6	1.4	75.8	12	3
2	去勢	勝忠平	朝開土井	H24.2.17	H26.3.31	25.3	441.8	A	5	60	8.2	2.0	75.4	11	4
3	去勢	安糸福	平茂勝	H24.2.16	H26.7.25	29.2	542.6	A	5	73	8.7	3.9	74.4	10	4
4	去勢	美津福	平茂勝	H24.3.11	H26.7.24	28.4	477.6	A	5	61	8.3	1.8	75.3	9	3
5	去勢	百合茂	安福	H24.2.29	H26.3.31	24.9	555.3	A	5	63	8.6	3.0	73.7	9	3
6	去勢	安糸福	平茂勝	H24.2.18	H26.3.31	25.3	446.2	A	5	55	8.6	3.6	73.4	9	4
7	去勢	福谷福	平茂勝	H24.2.27	H26.5.19	26.6	372.4	A	5	62	6.7	1.6	75.9	9	4
8	去勢	安福久	平茂勝	H24.7.19	H26.11.22	28.1	410.7	A	5	48	7.5	1.7	74.0	8	4
9	去勢	勝美	第20平茂	H24.9.9	H26.12.13	27.0	423.8	A	5	62	7.3	1.7	75.5	8	4
10	去勢	平茂勝	安平	H24.3.1	H26.8.19	29.5	509.4	A	5	62	8.0	1.5	75.0	8	4
11	去勢	安糸福	平茂勝	H24.2.26	H26.3.31	25.0	468.9	A	5	57	8.2	3.1	73.6	8	4
12	去勢	安平	糸秀	H24.3.15	H26.7.7	27.6	468.4	A	5	68	7.7	2.7	75.1	8	4
13	去勢	安糸福	金徳	H24.6.27	H26.10.6	27.2	414.1	A	4	61	7.2	1.4	75.7	7	4
14	去勢	安平幸	平茂勝	H24.7.5	H26.11.25	28.6	478.6	A	4	63	8.6	2.6	75.0	7	4
15	去勢	金幸	神高福	H24.3.6	H26.3.31	24.7	500.5	A	4	55	8.6	3.6	72.8	7	4
16	去勢	平茂勝	隆美	H24.3.1	H26.3.31	24.9	471.4	A	4	72	8.2	2.2	76.4	7	4
17	去勢	百合茂	神高福	H24.3.13	H26.8.13	29.0	504.3	A	4	65	6.7	1.8	74.5	7	4
18	去勢	金幸	第20平茂	H24.8.21	H26.11.25	27.0	428.2	A	4	57	7.3	1.5	75.0	7	4
19	去勢	福栄	平茂勝	H24.7.21	H26.12.9	28.6	604.2	A	4	59	8.7	3.1	73.9	7	4
20	去勢	平茂勝	神高福	H24.3.14	H26.3.31	24.4	495.1	A	4	59	8.1	2.1	74.4	6	3
21	去勢	糸晴	神高福	H24.3.14	H26.6.20	27.2	465.5	A	4	62	6.7	2.1	74.3	6	4
22	去勢	吾平藤	神徳福	H24.2.27	H26.6.20	27.7	402.0	A	3	54	6.9	2.6	73.7	6	5
23	去勢	神徳福	平茂勝	H24.3.9	H26.8.8	28.9	429.2	A	4	55	6.9	2.2	73.9	5	4
24	去勢	金幸	神高福	H24.9.9	H26.11.25	26.4	449.5	A	4	48	7.6	1.7	73.6	5	4
25	去勢	神徳福	平茂勝	H24.7.10	H26.9.30	26.5	356.4	B	3	43	6.3	1.9	73.0	5	4
26	去勢	神徳福	北国7の3	H24.7.6	H26.10.7	26.9	424.8	A	3	48	6.8	1.9	73.2	4	4
去勢平均		26頭				27.0	463.9			59.1	7.7	2.3	74.5	7.5	3.9
1	雌	第5隼福	平茂勝	H24.3.28	H26.8.7	28.3	340.3	A	5	46	6.7	1.4	74.3	10	4
2	雌	勝忠平	神徳福	H24.8.2	H26.11.22	27.6	314.2	A	5	46	6.2	1.8	74.0	10	4
3	雌	神徳福	金幸	H24.7.23	H26.9.25	26.0	364.6	A	5	49	7.3	1.6	74.7	10	4
4	雌	神徳福	糸藤	H24.8.7	H26.12.1	27.7	393.2	A	5	62	7.3	2.1	75.5	9	4
5	雌	百合茂	神高福	H24.8.1	H26.11.22	27.6	460.6	A	5	57	8.2	2.0	74.7	9	4
6	雌	百合茂	安糸福	H24.3.5	H26.9.11	30.2	411.1	A	5	52	7.7	1.6	74.8	9	4
7	雌	神徳福	金幸	H24.6.29	H26.9.12	26.4	446.1	A	5	57	8.7	2.3	74.9	8	4
8	雌	宝政	安平	H24.2.19	H26.4.26	26.1	460.0	A	5	59	7.8	3.1	73.9	8	4
9	雌	平茂勝	神高福	H24.2.13	H26.6.26	28.4	434.5	A	5	55	7.5	2.3	74.0	8	3
10	雌	安糸福	宝政	H24.3.11	H26.3.10	23.9	376.2	A	5	53	6.3	2.8	73.3	8	4
11	雌	忠茂勝	神徳福	H24.3.2	H26.8.19	29.5	409.4	A	4	57	6.4	2.1	74.1	7	5
12	雌	勝安竜	福美勝	H24.2.27	H26.7.25	28.8	515.0	A	4	65	7.4	3.0	73.7	7	4
13	雌	第5隼福	第20平茂	H24.2.9	H26.6.4	27.7	364.6	A	4	55	7.0	2.6	74.3	7	4
14	雌	平茂勝	安平	H24.3.6	H26.8.6	28.9	441.8	A	4	67	7.5	2.1	75.7	7	4
15	雌	平茂勝	輝桜	H24.2.24	H26.4.28	26.0	368.0	A	4	45	8.8	2.1	74.7	7	4
16	雌	神徳福	金幸	H24.7.29	H26.12.8	28.2	382.0	A	4	59	6.4	1.7	75.0	7	4
17	雌	勝忠平	金幸	H24.8.5	H26.11.22	27.5	375.7	A	4	63	6.6	1.7	75.8	7	5
18	雌	平茂勝	神高福	H24.3.9	H26.7.24	28.4	445.1	A	4	62	8.2	2.6	75.0	7	4
19	雌	金幸	平茂勝	H24.2.19	H26.7.24	29.1	449.0	A	4	57	7.4	1.8	74.5	6	3
20	雌	神徳福	金幸	H24.9.6	H26.12.17	27.3	436.0	A	4	53	7.3	3.2	72.7	6	4
21	雌	神徳福	金幸	H24.8.8	H26.11.22	27.4	370.9	A	4	56	6.9	2.2	74.7	6	5
22	雌	百合茂	第5隼福	H24.8.20	H26.11.22	27.0	403.4	A	3	50	6.6	1.5	73.9	4	4
雌平均		22頭				27.6	407.4			55.7	7.3	2.2	74.5	7.6	4.0
全体平均		48頭				27.3	438.0			57.5	7.5	2.2	74.5	7.5	4.0

※間接後代検定牛を含む

【現場検定枝肉成績の特徴】

- ・ 脂肪交雜の形状，肉テリ，モモへのサシ抜けが良い
- ・ 去勢・雌ともに肉質良好 → 4等級以上率92%

	去勢	雌	全体
5率	46%	45%	46%
4率	42%	50%	46%
計	88%	95%	92%